ТИББИЁТДА ҚЎЛЛАНИЛИШИГА ДОИР ЙЎРИҚНОМА
ТЕРИКС™
TERIX™

Препаратнинг савдо номи: Терикс™
Таъсир этувчи модда (ХПН): цетиризин дигидрохлориди (cetirizine hydrochloride)
Дори шакли: плёнка қобиқ билан қопланган таблеткалар
Таркиби
Плёнка қобиқ билан қопланган 1 таблетка қуйидагиларни сақлайди:
фаол модда: 10 мг цетиризин дигидрохлориди;
ёрдамчи моддалар: маккажўхори крахмали, лактоза моногидрати, PVT K30, магний стеарати, Sheffcoat white 04 5X00257/5X00266 (гидроксипропилметилцеллюлоза/гипромеллоза, титан диоксиди, полиэтиленгликоль/макроголь)
Таърифи: оқ рангли, узунчоқ шаклли, икки томонида рискаси бўлган плёнка қобиқ билан қопланган таблеткалар. Таблеткани тенг икки қисмга бўлиш мумкин.
Фармакотерапевтик гуруҳи: Тизимли қўллаш учун антигистамин воситалар. Пиперазин ҳосилалари.
АТХ Коди: R06AE07
Фармакологик хусусияти
Фармакодинамикаси
Одамда гидроксизин метаболити бўлган цетиризин H_1-гисатмин рецепторларининг кучли селектив периферик антогонисти ҳисобланади. Аллергик касалликларда антигенлар таъсир қилганда цетиризин 10 мг суткада 1 маҳал ёки 2 маҳал қабул қилинганда H_1-рецепторларига антогонистик таъсиридан ташқари аллергик реакцияларнинг кечки босқичларида яллиғланиш медиаторлари айниқса, терида ва бириктирувчи тўқималарда эозинофиллар ажралишини чегаралайди ва аллергияга қарши таъсир кўрсатади. Бронхиал астмаси бўлган пациентларда цетиризин суткада 30 мг қабул қилинганда нафас йўли билан кирган махсус аллергенлар таъсирида бронхларни кечки сиқилиш фазасида эозинофилларни бронхоалвеоляр суюқликка ажралишини чегаралайди. Бундан ташқари цетиризин сурункали эшакеми мавжуд пациентларда калликреин тери ичига юбориб қўзғатилганда яллиғланиш реакциясининг кечки босқичини блоклайди.
Фармакокинетикаси
Сўрилиши
Цетиризин қон плазмасидаги максимал концентрациясига 1,0±0,5 соатда эришади, ва тахминан 300 нг/мл ни ташкил этади. Овқатни қабул қилиш сўрилиш даражасига таъсир қилмайди, лекин сўрилиш тезлигини пасайтиради.
Тақсимланиши
Тахминий тақсимланиш ҳажми – 0,5 л/кг ташкил қилади. Қон плазмаси оқсиллари билан боғланиши 93%±0,3% га тенг.
Метаболизми
Цетиризин жигардан бирламчи ўтиш жараёнида экстенсив метаболизмга учрамайди.
Чиқарилиши
Якуний ярим чиқарилиш даври тахминан 10 соатга тенг. Препаратни суткада 10 мг дозада 10 кун қабул қилинганда цетиризиннинг ҳеч қандай кумуляцияси кузатилмаган. Дозанинг 2/3 қисми буйрак орқали ўзгармаган ҳолда чиқарилади.
Қўлланилиши
Плёнка қобиқ билан қопланган Терикс 10 мг катталар ҳамда 6 ёш ва ундан катта болаларда қуйидаги касалликларда:
- Поллиноз (мавсумий аллергик ринитлар ва конъюнктивитлар)
- Аллергик қичишиш
- Идиопатик эшакеми
- Квинке шишида қўлланилади.

Қўллаш усули ва дозалари
Терикс таблеткалари ичга 1 стакан сув билан бирга қабул қилинади.
6-12 ёшгача бўлган болаларга: 5 мг (1/2 таблетка) суткада 2 марта.
Катталар ва 12 ёшдан катта болалар: 10 мг (1 таблетка) суткада 1 марта.
Махсус гуруҳ беморлари учун қўшимча маълумотлар
Буйрак етимшовчилиги бўлган пациентлар
Препарат дозасига буйрак фаолияти ҳолатига боғлиқ ҳолда тузатиш киритилади.
Креатинин клиренси (CLcr, мл/мин) қуйидаги формула орқали аниқланилади:

$$\text{Clcr (мл/мин)} = \frac{[140 - \text{ёши (йил)}] \times \text{тана вазни (кг)}}{72 \times \text{қон плазмасида креатинин (мг/дл)}} (\times 0{,}85 - \text{аёллар учун})$$

Буйрак фаолияти бузилишлари бўлган пациентларда дозаларга тузатиш киритиш қуйидаги жадвал бўйича амалга оширилади:

Буйрак фаолиятининг оғирлик даражаси	Креатинин клиренси	Дозалаш тартиби
Нормал	≥80	10 мг дан суткада 1 марта
Енгил	50-79	10 мг дан суткада 1 марта
Ўртача	30-49	5 мг дан суткада 1 марта
Оғир	<30	5 мг дан 2 суткада 1 марта
Диализ ўтказилаётган пациентлар, буйрак етишмовчилигининг терминал босқичида	<10	Қўлланилиши мумкин эмас

Жигар етишмовчилиги бўлган пациентлар
Фақат жигар фаолиятида бузилиш бўлган пациентларда дозалаш тартибига тузатиш киритиш талаб қилинмайди. Жигар ва буйрак етишмовчилиги бўлган пациентлар учун дозалаш тартибига тузатиш киритиш талаб қилинади.
Педиатрик пациентлар
Плёнка қобиқ билан қопланган Терикс 10 мг таблеткалари 6 ёшгача бўлган болаларда қўлланилмайди (ушбу гуруҳ пациентларида таблетка шаклидаги препаратни аниқ дозалаш имкони йўқ).
Кекса ёшдаги пациентлар
Буйрак фаолияти нормал бўлган кекса ёшдаги пациентларда дозалаш тартибига тузатиш киритиш талаб қилинмайди.
Ножўя таъсилари
Мумкин бўлган ножўя самаралари организм тизимлари ва пайдо бўлиши тез-тезлиги бўйича қуйида келтирилган: жуда тез-тез (≥1/10), тез-тез (≥1/100, <1/10), тез-тез эмас (≥1/1000, <1/100), кам ҳолларда (≥1/10000, <1/1000), жуда кам ҳолларда (<1/10000), тез-тезлиги номаълум (маълумотларни етишмовчилиги туфайли).
Қон яратилиш ва лимфа тизими томонидан
Жуда кам ҳолларда: тромбоцитопения
Иммун тизими томонидан
Кам ҳолларда: юқори сезувчанлик
Жуда кам ҳолларда: анафилактик шок
Тез-тезлиги номаълум: иштаханинг ошиши
Рухият томонидан
Тез-тез: уйқучанлик
Тез-тез эмас: хавотирлик
Кам ҳолларда: тажовузкорлик, онгнинг чалкашиши, депрессия, галлюцинация, уйқусизлик
Жуда кам ҳолларда: тик
Тез-тезлиги номаълум: суицидиал фикрлар
Нерв тизими томонидан
Тез-тез: бош айланиши, бош оғриғи
Тез-тез эмас: парестезия
Кам ҳолларда: ҳаракатнинг бузилиши
Жуда кам ҳолларда: дисгевзия, дискинзия, дистония, ҳушдан кетиш, тремор
Тез-тезлиги номаълум: амнезия, хотирани сусайиши
Кўриш аъзоси томонидан
Жуда кам ҳолларда: аккомодациянинг бузилиш, кўришнинг ноаниқлиги, кўз олмасининг беихтиёрий ҳаракати
Эшитиш ва лабиринт тизими томонидан
Тез-тезлиги номаълум: бош айланиши
Юрак қон-томир тизими томонидан
Кам ҳолларда: тахикардия
Нафас олиш тизими, кўкрак қафаси аъзолари ва кўкс оралиғи томонидан
Тез-тез: фарингит, ринит
Овқат ҳазм қилиш тизими томонидан
Тез-тез: қоринда оғриқ, оғизни қуриши, кўнгил айниши, диарея
Гепатобилиар тизим томонидан
Кам ҳолларда: жигар фаолиятининг бузилиши (трансаминаза, ишқорий фосфотаза, гамма-глутамилтрансфераза ва билирубин даражасининг ошиши)
Тери ва тери ости клечаткаси томонидан
Тез-тез эмас: қичишиш, тери тошмаси
Кам ҳолларда: эшакеми
Жуда кам ҳолларда: ангионевротик шиш, доридан турғун эритема
Буйрак ва сийдик чиқариш йўллари томонидан
Жуда кам ҳолларда: дизурия, энурез
Тез-тезлиги номаълум: сийдикни тутилиши
Умумий бузилишлар ва маҳаллий реакциялар
Тез-тез: ланжлик
Тез-тез эмас: астения, ҳолсизлик
Кам ҳолларда: шиш
Лаборатор кўрсаткичлар:
Кам ҳолларда: тана вазнининг ошиши
Шубҳали ножўя таъсирлар ҳақида хабарлар
Дори препарати қайд этилгандан сўнг шубҳали ножўя таъсирлар ҳақидаги хабарлар муҳим аҳамиятга эга. Бу дори воситасининг хавф/фойда нисбатини назоратини амалга ошириш имконини беради.
Ножўя таъсирлар пайдо бўлганда шифокорга мурожаат қилинг.
Қўллаш мумкин бўлмаган ҳолатлар
- Цетирзинга, препаратнинг компонентлари, гидроксизинга ёки пиперазин ҳосилаларига юқори сезувчанлик
- Оғир даражадаги буйрак етишмовчилигида
- Галактозани ўзлаштираолмасликда, лаппа лактазани етишмовчилигида, глюкоза ва галактозани мальабсорбциясида қўллаш мумкин эмас.

Плёнка қобиқ билан қопланган Терикс 10 мг препаратини 6 ёшгача бўлган болаларда қўллаш тавсия этилмайди (ушбу гуруҳ пациентларида таблетка шаклидаги препаратни аниқ дозалаш имкони йўқ).
Дориларнинг ўзаро таъсири
Цетиризинни псевдоэфедрин, антипирин, циметидин, кетоконозол, эритромицин, теофиллин ва азитромиццин билан бир вақтда қўлланилганда фармакокинетик ўзаро таъсир кузатилмаган.
Цетиризинни циметидин, глипизид, диазепам, антипирин ва псевдоэфедрин билан бир вақтда қўлланилганда фармакокинетик ўзаро таъсир кузатилмаган.
Цетиризинни макролидлар ва кетоконозол билан бир вақтда қўлланилганда ЭКГ да аҳамиятли ўзгаришлар кузатилмаган.
Овқатни қабул қилиш сўрилиш ҳажмига таъсир қилмайди, бироқ сўрилиш тезлигини пасайтиради.
Антигистамин прапаратлар сохта мусбат натижаларга сабаб бўлиши мумкинлиги сабабли, аллергик тери синоваларини ўтказиш антигистамин препарати қабули қилингандан 3 кун ўтгандан сўнг амалга ошириш лозим.
Махсус кўрсатмалар
Препаратни терапевтик дозада алкогол билан бир вақтда қабул қилганда ҳеч қандай клиник аҳамиятли ўзаро таъсирлар кузатилмаган (қонда алкоголни миқдори 0,5 г/л).
Бироқ препаратни ва алкоголни бир вақтда қабул қилишда эҳтиёткорликка риоя қилиш керак. Сийдик тутилишига мойил бўлган ҳолларда препаратни эҳтиёткорлик билан буюриш керак, чунки цетиризин сийдик тутилиш хавфини ошириши мумкин (масалан, умуртқа поғонасининг шикасланишларида, простата бези гиперплазиясида).
Эпилепсия, шунингдек, тутқаноққа мойил бўлган пациентларга препаратни эҳтиёткорлик билан буюриш лозим.
1 таблетка Терикс препарати 64 мг лактоза моногидрати сақлайи. Галактозани ўзлаштираолмасликда, Лаппа лактаза етишмовчилигида, глюкоза ва галактозани мальабсорбциясида препаратни буюриш мумкин эмас.
Ҳомиладрлик ва лактация даврида қўлланилиши
Препаратнинг ҳайвонларда ўтказилган экспериментал тадқиқотларида бironта ҳам тератоген самара кузатилмаган бўлсада, Терикс препарати ҳомиладорлик даврида эҳтиёткорлик билан буюрилади.
Препарат кўкрак сутига ажралиши сабабли лактация даврида эҳтиёткорлик билан буюрилади.
Транспорт воситаларини бошқаришда ва бошқа потенциал хавфли механизмларни бошқаришга таъсири
Препаратни қабул қилиши натижасида пациентларда уйқучанлик ҳоллари кузатлиганда транспорт воситаларини ва бошқа механизмларни бошқаришдан сақланиш ва тавсия этилган дозани оширмасликлари лозим.
Дозани ошириб юборилиши
Препарат дозаси аҳамиятли даражада ошириб юборилганда, симптомлар марказий нерв тизими ва антихолинергик таъсир билан боғлиқ.
Тавсия этилган дозадан камида 5 марта юқори доза қўлланилганда қуйидаги симптомлар: онгнинг чалкашиши, диарея, бош айланиши, юқори толиқиш, бош оғриғи, юқори чарчоқлик, лоҳаслик, мидриаз, қичишиш, безовталик, седатив самара, уйқучанлик, тупор, тахикардия, тремор, сийдикни тутилиши кузатилган.
Цетиризиннинг махсус антидоти йўқ. Доза ошириб юборилганда сминптоматик ва самарани бир маромда тутиб турувчи даволаш ўтказилади. Препартни юқори дозалари қабул қилинганда меъдани ювиш лозим. Цетиризин гемодиализ орқали чиқарилмайди, цетиризиннинг дозаси ошириб юборилганда гемодиализ кам самаралидир.
Чиқарилиш шакли
Терикс 10 мг. 10 та плёнка қобиқ билан қопланган таблетка блистерда. 1 блистер тиббиётда қўлланилишига доир йўриқнома билан бирга картон қутида.
Сақлаш шароити
25 °С юқори бўлмаган ҳароратда, оргинал ўрамда ва болалар олоймайдиган жойда сақлансин.
Яроқлилик муддати
3 йил.
Яроқлилик муддати тугагандан сўнг қўлланилмасин.
Дорихоналардан бериш тартиби
Рецептсиз.

Ишлаб чиқаруви
Али Раиф Илач Сан. А. Ш.
Икителли ОСБ Махаллеси
10. Джадде №3/1А
Башакшехир/Истанбул/Туркия
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида дори воситасининг сифати бўйича эътирозлар (таклифлар) ни қабул қилувчи ташкилот номи ва манзили
«ASFARMA SAVDO» МЧЖ
100097, Тошкент ш., Ўзбекистон,
Чилонзор тумани, Ц квартал, 4А уй
Тел.: (+998 71) 273 70 95;

aris ali ralf ilaç sanayi Asfarma

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ
ТЕРИКС™
TERİX™

Торговое название препарата: Терикс™
Действующее вещество (МНН): цетиризина дигидрохлорид (cetirizine hydrochloride)
Лекарственная форма: таблетки, покрытые плёночной оболочкой
Состав
1 таблетка, покрытая плёночной оболочкой, содержит:
активное вещество: цетиризина дигидрохлорид 10 мг
вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактозы моногидрат, PVP K30, магния стеарат, Sheffcoat white 04 5X00257/5X00266 (гидроксипропилметилцеллюлоза/гипромеллоза, титана диоксид, полиэтиленгликоль/макрогол).
Описание: Таблетки, покрытые плёночной оболочкой, белого цвета, продолговатой формы, с риской на обеих сторонах. Таблетки можно разделить на две равные части.
Фармакотерапевтическая группа: Антигистаминные средства для системного применения. Производные пиперазина.
Код АТХ: R06AE07
Фармакологические свойства
Фармакодинамика
Цетиризин, метаболит гидроксизина у человека, является мощным селективным антагонистом периферических гистаминовых H_1-рецепторов. При приеме в дозе 10 мг 1 или 2 раза в сутки у аллергических пациентов, подвергшихся воздействию антигенов, цетиризин, кроме антагонистического действия на H_1- рецепторы, оказывает еще и противоаллергическое действие, ограничивая высвобождение медиаторов воспаления, в особенности, эозинофилов, в коже и соединительной ткани на поздней стадии аллергической реакции. При приеме в дозе 30 мг в сутки у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, цетиризин ограничивает приток эозинофилов в бронхоальвеолярную жидкость в течение поздней фазы сужения бронхов, вызванного вдыханием специфических аллергенов. Кроме того, цетиризин блокирует позднюю стадию воспалительной реакции, стимулированную внутрикожным введением калликреина, у пациентов с хронической крапивницей.
Фармакокинетика
Всасывание
Максимальная концентрация цетиризина в плазме достигается в течение 1,0±0,5 ч и составляет приблизительно 300 нг/мл. Прием пищи не влияет на степень всасывания, но снижает его скорость.
Распределение
Видимый объем распределения - 0,5 л/кг. Связывание с белками плазмы крови составляет 93%±0,3%.
Метаболизм
Цетиризин не подвергается экстенсивному метаболизму при первом прохождении через печень.
Выведение
Конечный период полувыведения составляет около10 ч. При приеме препарата в дозе 10 мг в сутки в течение 10 дней кумуляции цетиризина не наблюдается. Около ⅔ дозы выводится почками в неизмененном виде.
Показания к применению
Терикс 10 мг, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, применяется у взрослых и детей в возрасте 6 лет и старше при лечении следующих заболеваний:
- Поллиноз (сезонные аллергические риниты и конъюнктивиты)
- Хронический аллергический ринит и другие аллергические ринопатии
- Аллергический зуд
- Идиопатическая крапивница
- Отек Квинке.

Способ применения и дозы
Таблетки Терикс принимают внутрь, запивая 1 стаканом воды.
Детям 6-12 лет: 5 мг (½ таб) 2 раза в сутки.
Взрослым и детям старше 12 лет: 10 мг (1 таб) 1 раз в сутки.
Дополнительные данные, связанные со специальными группами больных
Пациенты с почечной недостаточностью
Доза препарата корректируется в зависимости от состояния функции почек.
Клиренс креатинина (CLcr, мл/мин) определяется при помощи следующей формулы:

$$\text{CLcr (мл/мин)} = \frac{[140 - \text{возраст (в годах)}] \times \text{масса тела (кг)}}{72 \times \text{креатинин сыворотки крови (мг/дл)}} (\times 0{,}85 \text{ для женщин})$$

У пациентов с нарушением функции почек режим дозирования корректируется согласно следующей таблице:

Степень тяжести функции почек	Клиренс креатинина	Режим дозирования
Нормальная	≥80	10 мг 1 раз в сутки
Легкая	50-79	10 мг 1 раз в сутки
Средняя	30-49	5 мг 1 раз в сутки
Тяжелая	<30	5 мг 1 раз в 2 суток
Терминальная стадия почечной недостаточности - пациенты, которым проводят диализ	<10	противопоказано

Пациенты с печеночной недостаточностью
У пациентов только с нарушением функции печени коррекции дозы не требуется. У пациентов с почечной и печеночной недостаточностью рекомендуется коррекция режима дозирования.
Педиатрические пациенты
Терикс 10 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, у детей в возрасте до 6 лет не применяются (ввиду невозможности точного дозирования препарата в форме таблеток у пациентов данной группы).
У детей с почечной недостаточностью доза корректируется индивидуально, с учетом почечного клиренса, возраста и массы тела пациента.
Пожилые пациенты
У пациентов пожилого возраста с нормальной функцией почек коррециии дозы не требуется.
Побочные действия
Частота возникновения побочных действий: очень часто (≥1/10); часто (от ≥1/100 до <1/10); нечасто (от ≥1/1000 до <1/100); редко (от ≥1/10000 до <1/1000); очень редко (<1/10000); с неизвестной частотой (не могут быть оценены на основе имеющихся данных).
Со стороны кроветворной и лимфатической системы
Очень редко: тромбоцитопения.
Со стороны иммунной системы
Редко: повышенная чувствительность
Очень редко: анафилактический шок.
Со стороны обмена веществ и питания
С неизвестной частотой: повышение аппетита.
Со стороны психики
Часто: сонливость
Нечасто: тревожность
Редко: агрессивность, спутанность сознания, депрессия, галлюцинации, бессонница
Очень редко: тик
С неизвестной частотой: суицидальные мысли.
Со стороны нервной системы
Часто: головокружение, головная боль
Нечасто: парестезия
Редко: судороги, двигательные расстройства
Очень редко: дисгевзия, дискинезия, дистония, обморок, тремор
С неизвестной частотой: амнезия, нарушение памяти.
Со стороны органа зрения
Очень редко: нарушение аккомодации, нечеткость зрения, непроизвольные движения глазного яблока.
Со стороны органа слуха и лабиринтной системы
С неизвестной частотой: головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы
Редко: тахикардия.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
Часто: фарингит, ринит.
Со стороны пищеварительной системы
Часто: боли в животе, сухость во рту, тошнота, диарея.
Со стороны гепатобилиарной системы
Редко: нарушение функции печени (повышение уровня трансаминаз, щелочной фосфатазы, гамма-глутамилтрансферазы и билирубина).
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Нечасто: зуд, кожная сыпь
Редко: крапивница
Очень редко: ангионевротический отек, стойкая лекарственная эритема.
Со стороны почек и мочевыводяших путей
Очень редко: дизурия, энурез
С неизвестной частотой: задержка мочи.
Общие расстройства и местные реакции
Часто: недомогание
Нечасто: астения, слабость
Редко: отек.
Лабораторные исследования
Редко: увеличение массы тела.
Сообщение о подозрительных побочных реакциях
Сообщение о подозрительных побочных реакциях после того, как лекарственный препарат был зарегистрирован, имеет важное значение. Это позволяет осуществлять длительный контроль соотношения польза/риск применения лекарственного средства.
При появлении нежелательных эффектов обращайтесь к врачу.
Противопоказания
- Повышенная чувствительность к цетиризину, к компонентам препарата, к гидроксизину или к производным пиперазина.
- Почечная недостаточность тяжелой степени (клиренс креатинина менее 10 мл/мин).
- Непереносимость галактозы, дефицит лактазы Лаппа, синдром мальабсорбции глюкозы и галактозы.

Применение препарата Терикс 10 мг таблетки, покрытые пленочной оболочкой, у детей в возрасте до 6 лет не рекомендуется (ввиду невозможности точного дозирования препарата в форме таблеток у пациентов данной группы).
Лекарственные взаимодействия
При одновременном применении цетиризина с псевдоэфедрином, антипирином, циметидином, кетоконазолом, эритромицином, теофиллином и азитромицином фармакокинетического взаимодействия не наблюдается.
При одновременном применении цетиризина с циметидином, глипизидом, диазепамом, антипирином и псевдоэфедрином фармакодинамического взаимодействия не наблюдается.
При одновременном применении цетиризина с макролидами или кетоконазолом клинически значимого изменения ЭКГ не наблюдается.
Прием пищи не влияет на объем абсорбции, хотя снижает ее скорость.
Поскольку антигистаминные препараты могут стать причиной ложноотрицательных результатов, рекомендуется проводить аллергические кожные пробы через 3 дня после приема антигистаминов.
Особые указания
При приеме препарата в терапевтических дозах одновременно с алкоголем клинически значимого взаимодействия не наблюдалось (при содержании алкоголя в крови 0,5 г/л). Однако рекомендуется быть осторожным при одновременном приеме препарата и алкоголя.
При склонности к задержке мочи препарат следует назначать с осторожностью, так как цетиризин может повысить риск развития задержки мочи (н-р, при повреждении позвоночника, гиперплазии предстательной железы).
При эпилепсии, а также склонности к судорогам рекомендуется с осторожностью назначать препарат.
1 таблетка препарата Терикс содержит 64 мг лактозы моногидрата. При непереносимости галактозы, дефиците лактазы Лаппа, синдроме мальабсорбции глюкозы и галактозы препарат не назначается.
Применение во время беременности и в период лактации
Несмотря на то что в экспериментах на животных не было выявлено ни одного тератогенного эффекта препарата, женщинам во время беременности следует с осторожностью назначать Терикс.
С осторожностью назначается в период лактации, поскольку проникает в грудное молоко.
Влияние на способность управления транспортными средствами и другими потенциально опасными механизмами
Пациентам, испытывающим сонливость во время приема препарата, необходимо воздерживаться от управления транспортными средствами и другими механизмами и не превышать рекомендованную дозу.
Передозировка
Симптомы, возникающие при значительной передозировке препарата, в основном связаны с влиянием на центральную нервную систему или с антихолинергическим действием.
Симптомы, наблюдающиеся при приеме дозы, превышающей рекомендованную не менее чем в 5 раз: спутанность сознания, диарея, головокружение, повышенная утомляемость, головная боль, недомогание, мидриаз, зуд, беспокойство, седативное действие, сонливость, ступор, тахикардия, тремор, задержка мочеиспускания.
Специфического антидота цетиризина нет. При передозировке проводится симптоматическая и поддерживающая терапия. При приеме высоких доз препарата следует немедленно провести промывание желудка. Цетиризин не удаляется из организма при гемодиализе; гемодиализ при передозировке цетиризина не эффективен.
Форма выпуска
Терикс10 мг.
10 таблеток, покрытых пленочной оболочкой, в блистере. 1 блистер в комплекте с инструкцией по медицинскому применению упакован в картонную коробку.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке и недоступном для детей месте.
Срок годности
3 года.
Не использовать после истечения срока годности.

Условия отпуска из аптек
Без рецепта.
Производитель
Али Раиф Илач Сан. А. Ш.
Икителли ОСБ Махаллеси
10. Джадде №3/1А
Башакшехир/Стамбул/Турция

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан
ООО «ASFARMA SAVDO»
100097, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Чиланзарский район, квартал Ц, дом 4А
Тел.: (+998 71) 273 70 95;

aris ali ralf ilaç sanayi Asfarma