



Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

# TIBERAL® 500 mq

Ornidazole



Tiberal® örtülü tabletər

Tiberal®

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Ornidazole

Tərkibi

Təsireddi maddə: 1 örtülü tabletin tərkibində 500 mq ornidazol vardır.

Kompleks maddələr: qarğıdalı nisastası, mikrokristallik selluloza, hipromelloza, magnezium-stearat; hipromelloza, talk, titan 4-oksid

Farmakoterapievit qrupu

Antiprotozoy dərman vasitəsi

ATC kodu: P01AB03

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Tiberal® *Trichomonas vaginalis*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia lamblia* (*Giardia intestinalis*), eləcə da *Bacteroides* və *Clostridium* spp., *Fusobacterium* spp. kimi bəzi anaerob bakteriyalara və anaerob kokklara qarşı effektiv təşir göstərir.

Farmakokinetikası

Sorulması

Daxil qəbul edildikdən sonra ornidazol tez sorulur. Orta hesabla sorulması 90% təşkil edir. Plazmada maksimal konsentrasiyası 3 saat ərzində yaranır.

Paylanması

Ornidazolun plazma ziülləri ilə birləşməsi 13% təşkil edir. Təsireddi maddə serebrospinal mayesinə, organizmın digər mayelərinə və toxumalarla effektiv konsentrasiyalarda nüfuz edir.

Ornidazolun plazma konsentrasiyası (6-36 mq/l) preparatin müxtəlif göstəriciləri üçün optimal saylanı şəviyyədədir. Sağlam könüllülərdə 500 mq və ya 1000 mq təkrar dozada qəbul edildikdən sonra hər 12 saatdan bir kumulyasiya əmsali 1,5-2,5-ə barabardır.

Metabolizmi

Ornidazol 2 hidroksimetil və α-hidroksimetilmətabolit əmələ galması ilə qaraciyardə metaboliza olunur. Hər iki metabolit *Trichomonas vaginalis* və anaerob bakteriyalara qarşı dayışılməmiş ornidazoldan az aktivdir.

Xaric olunması

Yarımxicilərə dövrü 13 saat təşkil edir. Birdəfəlik dozada qəbul edildikdən sonra ilk beş gün ərzində dozanın 85%-i metabolit şəklində xaric olur. Qəbul edilən dozanın 4%-i isə böyrükler vasitəsilə dayışılməmiş şəkildə xaric olur.

**Istifadəsinə göstərişlər**

- Trixomoniaz: qadınlarda və kişi lərde *Trichomonas vaginalis*-lə tərədilən sidik-cinsiyət sisteminin infeksiyasi;
- Amöbias: *Entamoeba histolytica* tərəfindən tərədilən bütün bağırsaq infeksiyaları, amöb dizenteriyası daxil olmaqla. Amöbiyazın bütün bağırsaqdankənar formaları, xüsusən qaraciyərin amöb absesi;
- Lyambliozi;
- Yəğun bağırsaqda və ginekoloji əməliyyatlar zamanı anaerob infeksiyaların profilaktikası.

**Oks göstərişlər**

Ornidazola, digər nitroimidazol törəmələrinə və ya preparatin hər hansı komponentə qarşı yüksək həssaslıq.

**Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri**

Ornidazol qəbulu zamanı və müalicədən sonra ən azı 3 gün ərzində alkoqol qəbul olunmamalıdır. Ornidadzol kumarin sırasından perorral antikoagulyantların təsirini gücləndirir, bu səbəbdən onların dozalanması tənzimlənməlidir.

Simetidin, fenitoin, fenobarbital kimi anti epileptik dərman vasitələrlə və litiumla birgə istifadəsi ehtiyatlı olmalıdır.

Ornidazol vekuronium-bromidin miorelaksasiyaedici təsirini uzadır.

**Xüsusi göstərişlər**

Epilepsiya, dağınq skleroz kimi mərkəzi sinir sisteminin xəstəlikləri və qaraciyər çatışmazlığı zamanı ehtiyatlı istifadə olunmalıdır. Digər dərman vasitələrinin təsiri arta və ya azala bilər.

**Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi**

**Hamiləlik**

Hamilə qadınlarda ehtiyatlı təyin olunmalıdır və mütləq göstəriş olmadıqda erkən dövründə istifadə olunmamalıdır.

**Laktasiya**

Ornidazolun ana südünə keçməsi haqqında məlumat mövcud deyil. Laktasiya dövründə olan ana mayesinə, organizmın digər mayelərinə və toxumalarla effektiv konsentrasiyalarda nüfuz edir.



## İstifadə qaydası və dozasi

Yeməkdən sonra su ilə daxil qəbul etmək lazımdır.

1. Trixomoniaz:

Tiberal® 500 mq örtülü tablet 1 günlük və 5 günlük müalicə sxemi ilə təyin olunur.

Müalicə müddəti	Dozalanma rejimi	
1 gün	3 tablet axşam, bir dəfəyə	
5 gün	1 tablet sahər 1 tablet axşam	

Ehtimal olunan təkrar yoxluşunun qarşısını almaq üçün cinsi tərəfdən da bütün hallarda həmin müalicə kursunu keçməlidir.

Uşaqlar üçün gündəlik doza 25 mq/kq təşkil edir və bir dəfəyə qəbul edilir.

2. Amöbias:

a) amöb dizenteriya: 3 günlük müalicə kursu;

b) amöbiyazin bütün formaları: 5-10 günlük müalicə kursu;

Müalicənin müddəti	Gündəlik doza	
	Böyüklər və 35 kq-dan artıq bədən kütləsi olan uşaqlar	35 kq-a qədər bədən kütləsi olan uşaqlar
3 gün	3 tablet axşam, bir dəfəyə; 60 mq-dan artıq bədən kütləsi olan xəstələr: 4 tablet (2 tablet sahər, 2 tablet axşam)	40 mq/kq tək dozada
5-10 gün	2 tablet (1 tablet sahər, 1 tablet axşam)	25mq/kq tək dozada

3. Lyambliozi:

Müalicənin müddəti	Gündəlik doza	
	Böyüklər və 35 kq-dan artıq bədən kütləsi olan uşaqlar	35 kq-a qədər bədən kütləsi olan uşaqlar
1-2 gün	3 tablet axşam, bir dəfəyə;	40 mq/kq tək dozada

4. Yəğun bağırsaqda və ginekoloji əməliyyatlar zamanı anaerob infeksiyaların profilaktikası: 1-2 tablet əməliyyatdan avval və 1 tablet gündə 2 dəfə əməliyyatdan sonra; müalicə müddəti 3-5 gün təşkil edir. Böyrük çatışmazlığı olan xəstələrdə doza tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur. Ağrı qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələrdə arası interval 2 dəfə uzadılmalıdır. Yaşlılarda preparatin istifadəsinə dair klinik məlumat yoxdur.

## Əlavə təsirləri

Əlavə təsirlərin rastgelən tezliyi: çox tez-tez ( $\geq 1/10$ ); tez-tez ( $\geq 1/100$ -dan  $< 1/10$ -dək); bəzən ( $\geq 1/1000$ -dan  $< 1/100$ -dək); nadir hallarda ( $\geq 1/10000$ -dan  $< 1/1000$ -dək); çox nadir hallarda ( $< 1/10000$ ); rast gelme tezliyi məlumat deyil.

## Qanyaradıcı və limfa sistemini

nadir hallarda: leykopeniya.

## Sinir sistemini

çox nadir hallarda: yuxululuq, baş ağrısi, başgıcalanma, tremor, rigidlik, koordinasiya pozulmaları, tutma, yorgunluq, vertigo, şüurun keçiriciliyi itinləşməsi, sensor və ya qarışiq periferik nevropatiya.

## Həzm sistemində

bəzən: ürəkbulanan, qusma, diareya, epigastral nahiyyəsində diskomfort, ağızda quruluq, iştahsızlıq;

nadir hallarda: dadbiləmə qabiliyətinin pozulması.

## Hepatobilär sistem

rast gelmə tezliyi məlumat deyil: sarihq, qaraciyər funksiyasının göstəricilərinin dəyişilməsi.

## Dori və dörialti piy toxumasına

nadir hallarda: qışınma və döri reaksiyaları.

## Doza həddinin aşılması

Doza həddinin aşılması zamanı "Əlavə təsirləri" bölməsində qeyd edilən simptomlar daha kəskin formada meydana çıxa bilər.

Spesifik antidöt yoxdur. Qolçuma zamanı diazepamın istfadəsi tövsiyə olunur.

## Buraxılış forması

Tiberal® 500 mq, 10 örtülü tablet, blisterdə. 1 blister (10 örtülü tablet) işlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

## Saxlama şəraitü

30°C-dən yüksək olmayan otaq temperaturunda, öz qutusunda, qaralıq və uşaqların əli çatmayı yerda saxlaması lazımdır.

## Yararlılıq müddəti

5 il.

Yararlılıq müddəti bittidən sonra istifadə etmək olmaz.

## Aptekdə buraxılma şərtləri

Rəsəpt asasında buraxılır.

## Qeydiyyat sahibi

Deva Holding A.Ş.

Halkalı Merkez Mah., Basın Ekspress Cad. № 1

34303 Küçükçelence/İstanbul/Türkiyə

## İstehsalçı

Deva Holding A.Ş.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mah., Atatürk Cad. № 32

Kapaklı/Tekirdağ/Türkiyə

AR SN Farmakoloji və Farmakopeya Ekspert Şurasında təsdiqlənmə tarixi: 29 oktyabr 2015-ci il

