



TƏSDİQ EDİLMİŞDİR  
Azərbaycan Respublikası  
Səhiyyə Nazirliyi  
Farmakoloji və Farmakopeya  
Eksperti Sürətlim sədidi

"M. Ağayev"  
"09" İyul 2015-ci il

Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə telimat (xəstələr üçün)

DİLYUTİK<sup>®</sup> örtülü tabletler

DILUTIX<sup>®</sup>

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Clopidogrel

Tərkibi

Təsiridəki maddə: hər örtülü tabletinin tərkibində 75 mg klopidogrel (97,875 mg klopidogrel hidrosulfat şəklinde)

Köməkçi maddələr: susuz laktzo, mikrokristallik sellüloza (Avicel PH 102), natrium kroskarmelloza, silisium dioksid (Aerosil 200), talk, maqnezium stearat; Opadry II Pink 32K14834 (laktzo monohidrat, hırpromelzo, titan dioksid, triasetin, qızılım demir oksidi) vədrir

Təsviri

Cəhrayı ranglı, yumru, bir tərəfində "75" basma yazılı örtülü tabletler.

Farmakoterapetvik qrupu

Antiagregant

ATC kodu: B01AC04

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Klopidogrel - prodrugard, selektiv olaraq adenozin-difosfatın (ADF), onun trombositlər üzərində olan receptorları ilə birləşməsinə GPIIb/IIIa kompleksinin ADF ilə törənen sonrakı aktivləşməsinə inbibidir, bu da trombositlərin aqresivitəsinin qarşısını alır. Klopidogrel tekrar olaraq gündə 75 mg dozada istifadə ilə gündən trombositlərin asılı aqresivitəsinə inhemiyəti dərəcədə inhibisiya edir; bu, tədricear artr və 3-cü 7-ci günər arası sabit veziyətə çatır. Trombositlərin aqresivitəsi və qanaxma müddəti müalicə kesildikdən sonra 5 gün arzında tədricən berpa olunur.

Farmakokinetikası

Gündə 75 mg tek və tekrar dozada daxili qəbul edildikdə klopidogrel sürətli sorulur. Klopidogrelin metabolizasiyasi dəliklə xərçənəsinə əsasən, klopidogrelin sorulması 50%-dan az təşkil edir. Klopidogrel və onun əsas sirkülasiyasına eden metabolitlərin *in vitro* geriye dönen şəkildə insansın plazma proteinləri ilə (müvafiq olaraq 98% və 94%) birləşir. Klopidogrel qaracardı aktiv metabolizmə uğrayır. İnsanlarda daxili qəbuldan sonra 120 saat arzında <sup>14</sup>C kimi nişanlanan klopidogrel təqribən 50%-i sidiklikle və 46%-i nüscüs xərçən olunur.

Istifadəsində göstərişlər

Böyük xəstələrdə aterotrombotik fəsadların profilaktikası:

- miokard infarkti, işemicik insult və ya müneyyən edilmiş periferik arteriyaların okkluzion xəstəliyi olan xəstələrdə;

- ST segmentinin yüksəkəsi ilə müşayiət olunmayan əsasən miokard infarkti, dərin keçən koronar müddəxilə və ya aort-koronar şuntlama emilyəti ilə xəstələr daxili olmaqla (stentləmə ilə və ya stentləməsiz);

- ST segmentinin yüksəkəsi ilə müşayiət olunan əsasən miokard infarkti dərman vasitələrlə müalicə və mümkün olan tromboliq terapiya zamanı asetilsalissil təsirə ilə kombinasiyada.

Əks göstərişlər

Klopidogrel və ya preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Ağrıcılar qarışmışlığı.

Pepitik xəradan qanaxma və ya kəllədaxılı qansızma kimi əsasən patoloji qanaxmalar.

Xüsusi göstərişlər

Klopidogrel ilə müalicə zamanı qanaxma və arzuolunmaz hematoloji reaksiyaların yaranmasına ehtimalına görə mümkin qanaxmanın klinik simptomları meydana çıxıdığda derhal qanın analizi keçirilməlidir.

Diger antiagregantlarda olduğu kimi travma, cərrahi emilyəti və ya digər patoloji həllər neticəsində qanaxma riski yüksək olan xəstələrdə, hemçinin asetilsalissil təsirə, QSİƏP, heparin, IIb/IIIa qlikoprotein inhibitorları və tromboliq mədələlər müalicə ilə xəstələr klopidogrel etibiyatla istifadə olunmalıdır.

Klopidogrel qəbul zamanı, xüsusilə müalicənin birinci həftəsində və/və ya invaziv kardioloji prosedurlarndan və ya cərrahi emilyətlərdən sonra qanaxmanın (o cümlədən gizli) olelmetlər istisna etmək məqsədi ilə xəstə həkimin ciddi nəzarət altında olmalıdır. Planlaşdırılmış cərrahi emilyətlərlə zamanı antitrombosit effekti arzu edilmiş olduğu üçün klopidogrel istifadəsi etibiyatdan 7 gün əvvəl dayandırılmışdır. Klopidogrel, qanaxma müddətinə uzadığında görə, qanaxma mayeili (xüsusilə de medə-bağışraq və gox daxılı) olan xəstələrde etibiyatla istifadə edilməlidir. Klopidogrel qəbul zamanı (monoterapiya kimi və ya asetilsalissil təsirə ilə kombinasiyada) qanaxmanın dayanmışlığı üçün dəha artıq vaxtın tələb olunması və həminin onlarında qeyri-adi qanaxma olduqda müalicə həkimini müräbat etməyi vaciblər haqqında xəstələr xəberdar edilməlidir. Hər hansı bir emilyətlərdən və ya dərmanın təyin edilməsindən əvvəl xəstələr klopidogrel qəbul etdikləri haqqında həkim (o cümlədən stomatologa) məlumat vermelidir. Klinik təcübə mehdud olduğundan böyrük çatışmazlığı olan xəstələrde klopidogrel etibiyatla istifadə edilməlidir. Klopidogrel orta dərəcələr qaraciyar çatışmazlığı olan xəstələrde hemorrhagik ditez ya qanaxma etibiyatına görə etibiyatla təyin olunmalıdır.

Dilutix<sup>®</sup> örtülü tabletlerinin tərkibində laktzo vardır. Qalaktzo qarşı dözdüşütsük. Lapp laktaza çatışmazlığı və ya qlukoza-qalaktzo malabsorbsiyasi sindromu kimi nadir rəsi xəstələrləri olan xəstələrdə bu preparat istifadə olunmamalıdır.

Nedilutix<sup>®</sup> örtülü tabletlerinin tərkibində 0,000167 mmol-dan (və ya 0,0038 mq-dan) az natrium var, hemin miqdardı olduda her hansı bir xüsusi göstəriş tələb olunmur.

Hamiliklilik və faktorslu dövründə istifadə

Hamiliklilik kategoriyası - B

Klinik istifadəsində haqqında məlumat olmadığından hamile qadınlara klopidogrel təyin olunması məsləhət görülür.

Farmakokinetic/toksikoloji tədqiqatlar göstərmişdir ki, klopidogrel və onun metabolitləri ana süd ilə ifraz olunur. Bu sebəbdən klopidogrelin qəbul zamanı ana süd ilə qidalandırma dayandırılmışdır.

Neqiyatlı vasitələrinin və digər potensial təhlükəli mexanizmlərin idarəetmə qabiliyyətine

təsir

Preparatın qəbulu neqiyatlı vasitələrinin və digər mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətine her hansı bir təsir göstərmir.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsir

Peroral antiakoagulyantlar

Klopidogrelin və peroral antiakoagulyantların birgə istifadəsi tövsiyə olunmur (qanaxmaların intensivləşməsi artır).

Qlikoprotein IIb/IIIa inhibitorları

Klopidogrel qlikoprotein IIb/IIIa inhibitorları ilə müalicə ilə xəstələrdə etibiyatla istifadə olunmalıdır.

Asetilsalissil təsir

Asetilsalissil təsir təsirini klopidogrelin trombositlerin ADF-ən asılı aqresivitəsinə göstərmişdir.

ST segmentinin yüksəkəsi ilə müşayiət olunan əsasən miokard infarkti dərman vasitələrlə müalicə ilə kombinasiyada.

Diabetik xəstələr

Klopidogrelin fibrin spesifik və ya fibrin qeyri-spesifik trombolytic vasitələr və heparinlə birgə istifadəsinin təhlükəsizliyi əsasən miokard infarkti keçirən xəstələrdə araşdırılmışdır. Klinik

İstifadəsində göstərişlər

Əks göstərişlər

Klopidogrel və ya preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Ağrıcılar qarışmışlığı.

Pepitik xəradan qanaxma və ya kəllədaxılı qansızma kimi əsasən patoloji qanaxmalar.

Xüsusi göstərişlər

Klopidogrel ilə müalicə zamanı qanaxma və arzuolunmaz hematoloji reaksiyaların yaranmasına ehtimalına görə mümkin qanaxmanın klinik simptomları meydana çıxıdığda derhal qanın analizi keçirilməlidir.

Diabetik xəstələr

Klopidogrelin fibrin spesifik və ya fibrin qeyri-spesifik trombolytic vasitələr və heparinlə birgə istifadəsinin təhlükəsizliyi əsasən miokard infarkti keçirən xəstələrdə araşdırılmışdır. Klinik

İstifadəsində göstərişlər

Əks göstərişlər

Klopidogrel və ya preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Ağrıcılar qarışmışlığı.

Pepitik xəradan qanaxma və ya kəllədaxılı qansızma kimi əsasən patoloji qanaxmalar.

Xüsusi göstərişlər

Klopidogrel ilə müalicə zamanı qanaxma və arzuolunmaz hematoloji reaksiyaların yaranmasına ehtimalına görə mümkin qanaxmanın klinik simptomları meydana çıxıdığda derhal qanın analizi keçirilməlidir.

Diabetik xəstələr

Klopidogrelin fibrin spesifik və ya fibrin qeyri-spesifik trombolytic vasitələr və heparinlə birgə istifadəsinin təhlükəsizliyi əsasən miokard infarkti keçirən xəstələrdə araşdırılmışdır. Klinik

İstifadəsində göstərişlər

Əks göstərişlər

Klopidogrel və ya preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Ağrıcılar qarışmışlığı.

Pepitik xəradan qanaxma və ya kəllədaxılı qansızma kimi əsasən patoloji qanaxmalar.

Xüsusi göstərişlər

Klopidogrel ilə müalicə zamanı qanaxma və arzuolunmaz hematoloji reaksiyaların yaranmasına ehtimalına görə mümkin qanaxmanın klinik simptomları meydana çıxıdığda derhal qanın analizi keçirilməlidir.

Diabetik xəstələr

Klopidogrelin fibrin spesifik və ya fibrin qeyri-spesifik trombolytic vasitələr və heparinlə birgə istifadəsinin təhlükəsizliyi əsasən miokard infarkti keçirən xəstələrdə araşdırılmışdır. Klinik

İstifadəsində göstərişlər

Əks göstərişlər

Klopidogrel və ya preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Ağrıcılar qarışmışlığı.

Pepitik xəradan qanaxma və ya kəllədaxılı qansızma kimi əsasən patoloji qanaxmalar.

Xüsusi göstərişlər

Klopidogrel ilə müalicə zamanı qanaxma və arzuolunmaz hematoloji reaksiyaların yaranmasına ehtimalına görə mümkin qanaxmanın klinik simptomları meydana çıxıdığda derhal qanın analizi keçirilməlidir.

Diabetik xəstələr

Klopidogrelin fibrin spesifik və ya fibrin qeyri-spesifik trombolytic vasitələr və heparinlə birgə istifadəsinin təhlükəsizliyi əsasən miokard infarkti keçirən xəstələrdə araşdırılmışdır. Klinik

İstifadəsində göstərişlər

Əks göstərişlər

Klopidogrel və ya preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Ağrıcılar qarışmışlığı.

Pepitik xəradan qanaxma və ya kəllədaxılı qansızma kimi əsasən patoloji qanaxmalar.

Xüsusi göstərişlər

Klopidogrel ilə müalicə zamanı qanaxma və arzuolunmaz hematoloji reaksiyaların yaranmasına ehtimalına görə mümkin qanaxmanın klinik simptomları meydana çıxıdığda derhal qanın analizi keçirilməlidir.

Diabetik xəstələr

Klopidogrelin fibrin spesifik və ya fibrin qeyri-spesifik trombolytic vasitələr və heparinlə birgə istifadəsinin təhlükəsizliyi əsasən miokard infarkti keçirən xəstələrdə araşdırılmışdır. Klinik

İstifadəsində göstərişlər

Əks göstərişlər

Klopidogrel və ya preparatın digər komponentlərinə qarşı yüksək həssaslıq.

Ağrıcılar qarışmışlığı.

Pepitik xəradan qanaxma və ya kəllədaxılı qansızma kimi əsasən patoloji qanaxmalar.

Xüsusi göstərişlər

Klopidogrel ilə müalicə zamanı qanaxma və arzuolunmaz hematoloji reaksiyaların yaran